

Flächendaten

Kreis	Steinburg
Gemeinde	Reher
Lage	Reher
Position (Breitengrad)	54.067
Position (Längengrad)	9.596
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,5139
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	v	-
<i>Ajuga reptans</i>	Kriech-Günsel	h	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	s	-
<i>Berula erecta</i>	Berle	s	-
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	s	-
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	v	-
<i>Carex leporina</i>	Hasenpfoten-Segge	h	-
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	h	-
<i>Carex vesicaria</i>	Blasen-Segge	s	-
<i>Carex vulpina</i>	Fuchs-Segge	v	-
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	h	-
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	h	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	h	-
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geflügeltes Johanniskraut	s	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	h	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	h	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	h	-
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	h	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	h	-
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinervige Nabelmiere	s	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	h	-
<i>Ranunculus flammula</i>	Flammender Hahnenfuß	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	h	-
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	h	-