

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Kosel
Lage	Bohnert, Lustberg
Position (Breitengrad)	54.539
Position (Längengrad)	9.745
Schutzstatus	
Fläche (ha)	1,9201
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	v	-
Agrostis tenuis	Rot-Straußgras	v	-
Bellis perennis	Gänseblümchen	v	-
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	v	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	v	-
Cirsium vulgare	Lanzett-Kratzdistel	s	-
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weißdorn	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Galium album	Weißes Labkraut	v	-
Geranium molle	Weicher Storchschnabel	v	-
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Hypochaeris radicata	Gemeines Ferkelkraut	v	-
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	v	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	v	-
Lotus corniculatus	Gemeiner Hornklee	v	-
Luzula campestris	Gemeine Hainsimse	v	-
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	s	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Plantago major	Breit-Wegerich	v	-
Poa annua	Einjähriges Rispengras	v	-
Poa pratensis	Wisen-Rispengras	v	-
Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	v	-
Prunus spinosa	Schwarzdorn	s	-
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuß	s	-
Rumex acetosella	Kleiner Ampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	v	-
Saxifraga granulata	Knöllchen-Steinbrech	v	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Thymus pulegioides	Gemeiner Thymian	v	-
Trifolium campestre	Feld-Klee	s	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	h	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennnessel	v	-
Vicia lathyroides	Platterbsen-Wicke	v	-