

Flächendaten

Kreis	Pinneberg
Gemeinde	Quickborn, Stadt
Lage	nördl. Quickborn, südlich Quickborner Heide
Position (Breitengrad)	53.737
Position (Längengrad)	9.937
Schutzstatus	
Fläche (ha)	2,5121
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Agrostis tenuis	Rot-Straußgras	v	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	v	-
Carex gracilis	Schlank-Segge	h	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex ovalis		v	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	v	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	v	-
Dactylis glomerata	Knautgras	v	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	v	-
Epilobium	Weidenröschen	v	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	d	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	v	-
Lotus uliginosus	Sumpf-Hornklee	v	-
Luzula pilosa	Haar-Hainsimse	s	-
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	s	-
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras	v	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Plantago major	Breit-Wegerich	s	-
Poa annua	Einjähriges Rispengras	v	-
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	v	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex acetosella	Kleiner Ampfer	s	-
Rumex obtusifolius	Stumpfbllättriger Ampfer	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	v	-
Stellaria media	Vogelmiere	v	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennnessel	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	v	-