

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Flintbek
Lage	s Fehltmoor sw Donnerhorst
Position (Breitengrad)	54.239
Position (Längengrad)	10.097
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,3716
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Mahd
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Ajuga reptans	Kriech-Günsel	s	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	d	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	v	-
Carex acuta	Schlank-Segge	h	-
Carex acutiformis	Sumpf-Segge	s	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex ovalis		s	-
Carex vesicaria	Blasen-Segge	s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
Cirsium oleraceum	Kohldistel	s	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	s	-
Eleocharis palustris	Gemeine Sumpfsimse	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüß	s	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	s	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	d	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	v	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	s	-
Lysimachia nummularia	Pfennig-Gilbweiderich	s	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	s	-
Plantago major	Breit-Wegerich	s	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	s	-
Quercus robur	Stiel-Eiche	r	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	s	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Stellaria alsine	Quell-Sternmiere	s	-
Taraxacum sect. Ruderalia		s	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	s	-